

El sexe narcotitzat floreix entre els joves europeus

sms25.cat, octubre de 2008

La triada "**sexe, drogues i rock'n'roll**" és cada cop més una realitat quotidiana per molts joves, al menys pel que fa als seus dos primers components. Segons un estudi publicat a **BMC Health**, existeix entre els **joves europeus una tendència a barrejar conscientment drogues i sexe** per tal d'aconseguir els més diversos objectius, des de la desinhibició fins a una major resistència dins la relació sexual.

La investigació ha partit d'una mostra de **1.341 joves** d'entre **16 i 25 anys** acostumats a freqüentar els clubs de moda de Liverpool, Palma de Mallorca, Viena, Atenas, Venècia, Lisboa, Berlín, Brno a la República Checa i Ljubljana a Eslovènia. Un estudi, doncs, prou representatiu que **il·lustra el fracàs de les campanyes de prohibició i persecució de les drogues**. Potser seria, doncs, hora d'anar pensant en fer les coses d'una altra manera.

La Generalitat reobre el debat sobre el copagament de la sanitat

La consellera Geli diu que si els diners no venen de l'Estat, vindran de taxes

La **crisi** i la manca de finançament de la Generalitat por arribar a la sanitat catalana. Marina Geli va decidir reobrir **el debat sobre el copagament de taxes per part dels usuaris de la sanitat pública**

Metges de Catalunya confia que el nou director de l'ICS, Enric Argelagués, obri una via de diàleg amb els facultatius "fins ara inexistent"

metges.de.catalunya, octubre 2008



Metges de Catalunya (MC) confia que el nou director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Enric Argelagués, obri una via de diàleg amb els facultatius fins ara inexistent i que la relació amb l'empresa pública de salut sigui molt més fluïda que durant l'etapa del seu antecessor, Francesc José María.

El sindicat es mostra esperançat amb el nomenament d'Argelagués, ja que té una dilatada experiència professional a l'ICS, com a metge i també com a gestor, i, per tant, coneix de primera mà quins són els problemes de l'empresa.

Els efectes nocius del consum d'èxtasi perduren en el temps

Imim, 14 d'octubre de 2008

Segons els resultats de l'estudi publicat recentment en el Journal of Psychopharmacology, **el consum d'èxtasi ocasiona problemes en la fluïdesa verbal, la memòria de treball i la velocitat en el processament de la informació. Aquests efectes es mantenen en el temps i fins i tot podrien no desaparèixer quan s'interromp el consum.**

Tots els dèficits cognitius observats, es potencien quan el consum d'èxtasi té lloc juntament amb el consum de cànnabis.

Geli destaca la 'fortalesa' de la unió entre les universitats Autònoma i Pompeu Fabra en els nous estudis de Medicina

[ACN 13.10.2008](#)

Barcelona.- La consellera de Salut, Marina Geli, ha participat en l'acte de presentació dels nous estudis de Medicina a l'hospital del Mar de Barcelona, un projecte que comparteixen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La consellera ha destacat 'la fortalesa' de la unió entre les administracions i la seva capacitat docent ja que els estudiants quan acabin d'aquí a sis anys tindran 'un títol de metge atorgat per dues universitats conjuntament' i a més tota la seva tasca de recerca. El projecte té el suport d'un centre assistencial com l'hospital del Mar i dos de recerca com l'IMIM i el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

Els experts alerten que el consum de cànnabis pot triplicar el risc de patir esquizofrènia

Els experts internacionals alerten que el consum de cànnabis influeix en el risc de patir trastorns mentals

[avui.cat, 10 d'octubre](#)

Es presenta un diccionari d'infermeria en català a l'Institut d'Estudis Catalans

[Bloc de Bellvitge, octubre 2008](#)

Impulsat pel TERMCAT, és fruit del consens entre institucions infermeres d'arreu del territori

Salut destitueix el gerent de l'ICS

Ha estat cessat per un "procés de reordenació d'alguns càrrecs directius" i després d'una gestió marcada per la polèmica.

Campanya de vacunació antigripal

Durant la campanya s'aplicaran de forma gratuïta prop d'1.500.000 dosis de vacuna antigripal

El [Departament de Salut](#) ha iniciat la campanya de vacunació contra la grip que acabarà el 30 de novembre. Enguany, s'aplicaran de forma gratuïta prop d'1.500.000 dosis de vacuna antigripal, tant en persones pertanyents a grups de risc com en els altres grups de població a qui va adreçada.

La vacunació antigripal s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip com són:

- Persones de 60 anys o més.
- Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalties cròniques i malalties mentals, etc.
- Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, inclòs l'asma.
- Adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l'any anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (inclosa la diabetis mellitus), malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloses les causades per medicació o pel VIH).
- Infants i adolescents (dels 6 mesos als 18 anys) tractats durant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
- Dones embarassades (l'administració de la vacuna es considera segura en les embarassades).

Aquesta tardor que no us agafi
la grip:
vacuneu-vos
al vostre centre de salut

Us recomanem que us vacineu si:

- Teniu 60 anys o més.
- Patiu malalties cròniques.
- Sou infants o adolescents que heu estat tractats durant un temps prolongat amb àcid acetilsalicílic.
- Esteu embarassada.
- Conviviu o esteu en contacte amb persones malaltes de risc.

Us podeu vacunar des de l'1 d'octubre fins al 30 de novembre de 2008.

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Diferents estratègies per deixar de fumar.



[Fòrum clínic, octubre 2008](#)

És ben conegut que l'hàbit de fumar incrementa de manera molt important el risc de patir malalties cardio i cerebrovasculars; tant és així que el tabaquisme constitueix el factor de risc més important perquè es desenvolupi aquest tipus de malalties. El tabac és la primera causa de mort que es pot prevenir, en els països desenvolupats (CDC, 2005).